

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ouvrez le sachet et versez le contenu dans le piège (reportez-vous à la notice d'utilisation du piège pour vous assurer de le placer au bon endroit), rajoutez 1 litre d'eau minimum et bien mélanger. Vous devez bien délayer pour obtenir un mélange homogène.

Nous vous recommandons de placer le piège (posé, suspendu ou accroché), au soleil et à une hauteur minimum de 1,5 mètres du sol, ainsi qu'à une distance de 8 mètres minimum des entrées de maison, des terrasses et des zones de détente.

Pour garder l'efficacité du piège, maintenez toujours le niveau d'eau et veuillez changer le mélange eau et recharge toutes les 2 à 3 semaines en fonction du remplissage du piège. Si le niveau d'eau se réduit par évaporation, rajoutez de l'eau jusqu'au niveau indiqué. En cas de faible capture, n'hésitez pas à déplacer le piège à un autre endroit.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Durée de stockage 24 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

RECHARGE PIÈGE À MOUCHES



**1 recharge + 1 L d'eau
= 3 semaines de protection**



SANS PESTICIDE

50g



Composition : TAP 29 (CAS : 146317-23-9) 48,8% ; Bicarbonate de Sodium (CAS : 144-55-8 EINECS : 205-633-8) ; Polydextrose (CAS : 68424-04-4) 15% ; Amidon (CAS : 9005-25-8 EINECS : 232-679-6) substance avec une limite d'exposition sur le lieu de travail communautaire 9,5% ; Eau (CAS : 7732-18-5 EINECS : 231-791-2) 4,2%

En cas de contact avec la peau : rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un centre Antipoison ou un médecin. **En cas de contact avec les yeux :** si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être enlevées facilement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. **En cas d'indigestion :** si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison ou un médecin. **En cas d'inhalation :** si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison ou un médecin. Si conseil médical est nécessaire, garder l'emballage ou la notice à disposition.